

C20007

Liebe Patientin!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Gebrauchsinformation

Canifug® Cremolum® 200

200 mg Clotrimazol pro Vaginalzäpfchen

Zusammensetzung

1 Vaginalzäpfchen Canifug Cremolum 200 enthält als Wirkstoff 200 mg Clotrimazol.

Sonstige Bestandteile: Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.) [pflanzlich], Hartfett, Macrogol-20-glycerolmonostearat, Polyacrylsäure-Natriumsalz.

Darreichungsform und Inhalt

Vaginalzäpfchen zur vaginalen Anwendung; Packung mit 3 Vaginalzäpfchen

Anti-Pilzmittel (Antimykotikum)

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld
Telefon: 0521/8808-05; Telefax: 0521/8808-334
E-Mail: info@wolff-arzneimittel.de

Anwendungsgebiete

Infektionen der Scheide durch Hefepilze (meist *Candida albicans*).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Canifug Cremolum 200 nicht anwenden?

Wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Clotrimazol, Cetylstearylalkohol oder einem der sonstigen Bestandteile von Canifug Cremolum 200 sind.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Canifug Cremolum 200 sollte aus Vorsicht in der Frühschwangerschaft (1. bis 3. Monat) nicht angewendet werden. Ab dem 4. Monat der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit ist eine Anwendung von Canifug Cremolum 200 nach ärztlicher Anweisung möglich.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu beachten?

Besondere Anpassungen sind nicht notwendig.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol empfiehlt es sich, cetylstearylalkoholfreie Darreichungsformen zu verwenden.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Canifug Cremolum 200

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Wechselwirkungen

Welche Arzneimittel beeinflussen sich in der Wirkung?

Durch den Wirkstoff Clotrimazol vermindert Canifug Cremolum 200 die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin).

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Welche Kosmetika sollten Sie meiden?

Desodorantien oder Mittel zur Intimhygiene sollten Sie nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden, da eine Minderung der Wirksamkeit von Canifug Cremolum 200 nicht ausgeschlossen werden kann.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Canifug Cremolum 200 nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Canifug Cremolum 200 sonst nicht richtig wirken kann.

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Canifug Cremolum 200 pro Tag anwenden?

1 Vaginalzäpfchen Canifug Cremolum 200 (= 200 mg Clotrimazol) wird 1-mal täglich an 3 aufeinander folgenden Tagen in die Scheide eingeführt.


Wie und wann sollten Sie Canifug Cremolum 200 anwenden?

Das Vaginalzäpfchen wird jeweils am Abend mit einem zuvor gesäuberten Finger möglichst tief in die Scheide eingeführt.

Dies geschieht am besten in Rückenlage mit leicht angezogenen Beinen.

Die Behandlung sollte zweckmäßigerweise nicht während der Menstruation durchgeführt werden bzw. vor deren Beginn abgeschlossen sein.

Zum Entnehmen des Vaginalzäpfchens aus dem Bliester ziehen Sie bitte die beiden Folien an der Spitze des Zäpfchens auseinander, wie es in der nebenstehenden Abbildung gezeigt ist.



Während der Anwendung der Vaginalzäpfchen sollte ein Slip mit Slip-Einlage getragen werden, um Fettflecke in Textilien zu vermeiden.

Wie lange sollten Sie Canifug Cremolum 200 anwenden?

Im allgemeinen ist eine Behandlungsdauer von 3 Tagen mit Canifug Cremolum 200 ausreichend.

Halten Sie bitte diese Zeit auch dann ein, wenn Sie sich bereits besser fühlen.

Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Anwendung von Canifug Cremolum 200 vergessen haben?

Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie am folgenden Tag bitte nicht die doppelte Menge von Canifug Cremolum 200 an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Dosis wieder auf.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung für mehr als einen Tag unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt die weitere Vorgehensweise, da in beiden Fällen der Behandlungserfolg gefährdet ist.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Canifug Cremolum 200 auftreten?

Gelegentlich können Hautirritationen wie z. B. Brennen, Stechen oder vorübergehende Rötung vorkommen. Bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff Clotrimazol oder einen der sonstigen Bestandteile von Canifug Cremolum 200 können allergische Reaktionen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf der Lasche der Verpackung aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Canifug Cremolum 200 aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern, da sonst die Vaginalzäpfchen zu schmelzen beginnen.

Stand der Information: Juli 2006

Zusätzliche Erläuterungen:

Pilzinfektionen (= Mykosen) entstehen durch Pilze (z. B. Candida-Arten), die auf der Haut und bei sehr vielen Frauen auch in der Scheide nachweisbar sind. Erst bei übermäßiger Vermehrung entsteht eine Pilzinfektion (Mykose), die sich meist durch Rötungen, Brennen, Juckreiz, Ausfluss und schmerzhaftes Entzündungen bemerkbar macht. Eine sichere Erkennung ist nur durch den Arzt möglich.