

# BENZAKNEN® Wash 5%



## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender Benzaknen® Wash 5% Suspension zur Anwendung auf der Haut Wirkstoff: Benzoylperoxid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.  
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Benzaknen® Wash jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Benzaknen® Wash und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Benzaknen® Wash beachten?
3. Wie ist Benzaknen® Wash anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Benzaknen® Wash aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST BENZAKNEN® WASH UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Benzaknen® Wash ist ein Aknemittel zur Anwendung auf der Haut.

Benzaknen® Wash wird angewendet bei allen Formen der Akne leichter Ausprägung sowie zur unterstützenden Therapie bei Akne mittlerer bis schwerer Ausprägung.

Benzaknen® Wash wird angewendet bei Jugendlichen (ab 12 Jahren) und Erwachsenen.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON BENZAKNEN® WASH BEACHTEN?

**Benzaknen® Wash darf nicht angewendet werden**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Benzoylperoxid oder einen der sonstigen Bestandteile von Benzaknen® Wash sind.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Benzaknen® Wash ist erforderlich**

- wenn Sie zu Heuschnupfen, allergischem Asthma oder Neurodermitis neigen (Atopie) und Ihre Haut trocken ist und wenig Talg produziert (Sebostase). In diesem Fall fragen Sie bitte Ihren Arzt vor der Anwendung von Benzaknen® Wash.

- Wenden Sie keine zusätzlichen hautreizenden Mittel an, da es sonst zu verstärkten Hautreizungen kommen kann.

- Vermeiden Sie intensive UV-Lichtbestrahlung (Sonne, Solarien), da es hierbei zu verstärkten Hautreizungen kommen kann.

- Benzaknen® Wash darf nicht mit Schleimhäuten, abgeschürfter Haut, den Augen oder den Mund-, Nasen- und Augenwinkeln in Berührung gebracht werden.

- wenn Benzaknen® Wash versehentlich in Kontakt mit den Augen gekommen ist. Kontakt mit den Augen führt zu Rötung und Brennen. Das Auge soll dann ca. 15 Minuten mit reichlich fließendem Wasser gespült werden.

- wenn Benzaknen® Wash versehentlich eingenommen wurde. Benzoylperoxid, der Wirkstoff von Benzaknen® Wash, kann bei versehentlicher Einnahme Beschwerden im Bereich der Speiseröhre und des Magens hervorrufen. Suchen Sie einen Arzt auf.

- Der in Benzaknen® Wash enthaltene Wirkstoff Benzoylperoxid kann zur Bleichung (Entfärbung) oder farblichen Veränderung von Haaren (einschließlich der Augenbrauen) und farbigen Textilien (z.B. T-Shirts, Bettwäsche, Schlafanzüge, Waschlappen, Handtücher) führen und diese so beschädigen. Diese Effekte können bei direktem Kontakt des Produktes mit Textilien oder Haaren, aber auch bei indirektem Kontakt, z.B. über die Hände oder die behandelte Haut, auftreten. Auch nach dem Einziehen des Produktes in die Haut oder nach dem Abwaschen des Produktes von der Haut kann die Bleichwirkung bestehen bleiben. Um möglichen Beschädigungen vorzubeugen wird während der Dauer der Behandlung empfohlen, die Hände nach der Anwendung von Benzaknen® Wash gründlich mit Seife und ggf. Nagelbürste zu reinigen sowie einen Kontakt des Produktes oder der behandelten Haut mit den Haaren zu vermeiden, z.B. durch die Verwendung von Haargummis oder Haarklammern. Während der Dauer der Behandlung ist die Verwendung von weißen Textilien empfehlenswert.

#### Kinder

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Benzaknen® Wash wurden bei Kindern vor der Pubertät (unter 12 Jahren) nicht untersucht, da in dieser Altersgruppe Akne vulgaris selten auftritt.

**Bei Anwendung von Benzaknen® Wash mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Das Präparat sollte jedoch nicht gleichzeitig mit hautreizenden Salben, Cremes usw. angewendet werden (siehe oben).

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine tierexperimentellen Studien in Bezug auf eine Reproduktionstoxizität vor.

Daten zur Anwendung in der Schwangerschaft am Menschen liegen nicht vor.

Benzaknen® Wash sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nach sorgfältiger Abschätzung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses angewendet werden.

Im letzten Monat der Schwangerschaft sollte das Präparat nicht angewendet werden.

Erkenntnisse über den Übergang in die Muttermilch nach externer Behandlung in der Stillzeit liegen nicht vor.

Fragen Sie vor der Einnahme /Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### 3. WIE IST BENZAKNEN® WASH ANZUWENDEN?

Wenden Sie Benzaknen® Wash immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Benzaknen® Wash ist nur zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 12 Jahren und darüber bestimmt.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Die erkrankten Hautpartien werden 1mal täglich mit Benzaknen® Wash behandelt. In schweren Fällen bzw. zur Verstärkung des Therapieeffektes kann die Dosierung auf 2mal täglich gesteigert werden.

Nach Befeuchten der erkrankten Hautpartien wird Benzaknen® Wash auf die Haut aufgetragen und verrieben. Anschließend sofort abwaschen und abtrocknen. Kontakt mit Augen, Nasen- und Mundschleimhäuten vermeiden; ggf. mit reichlich Wasser abspülen. Eine zusätzliche Reinigung der erkrankten Hautpartien ist nicht erforderlich und kann den Therapieerfolg mindern.

Das Präparat ist ausschließlich zur Anwendung auf der Haut bestimmt.

Die durchschnittliche Anwendungsdauer beträgt 4-12 Wochen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Benzaknen® Wash zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge Benzaknen® Wash angewendet haben, als Sie sollten**

Die Anwendung zu großer Mengen Benzaknen® Wash kann übermäßiges Austrocknen und verstärktes Schälen der Haut zur Folge haben. Setzen Sie in diesen Fällen die Anwendung von Benzaknen® Wash aus und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.

**Wenn Sie die Anwendung von Benzaknen® Wash vergessen haben**

Setzen Sie die Behandlung entsprechend der angegebenen Dosierungsanleitung fort.

**Wenn Sie die Anwendung von Benzaknen® Wash abbrechen**

sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Benzaknen® Wash Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 Behandelte von 10
<b>Häufig:</b>	1 bis 10 Behandelte von 100
<b>Gelegentlich:</b>	1 bis 10 Behandelte von 1000
<b>Selten:</b>	1 bis 10 Behandelte von 10 000
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 Behandelte von 10 000
<b>Nicht bekannt:</b>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Alle in klinischen Studien beobachteten Nebenwirkungen betreffen die Haut, s. folgende Tabelle:

Organklassensystem (MedDRA)	Häufigkeit	Nebenwirkung
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes	Sehr häufig	Rötung (Erythem), Brennen, Trockenheit und Schälen der Haut
	Häufig	Juckreiz Hautreizung Stechen der Haut
	Gelegentlich	Kontaktallergische Sensibilisierungen
	Nicht bekannt*	Gesichtsschwellung

\* Daten aus Post-Marketing-Beobachtungen

Gelegentlich können Benzoylperoxid oder sonstige Bestandteile von Benzaknen® Wash zu Überempfindlichkeitsreaktionen (kontaktallergische Sensibilisierung) führen. In diesen Fällen sollte das Präparat abgesetzt und der Arzt aufgesucht werden.

Der Therapiebeginn kann bei empfindlichen Patienten mit leichter Hautrötung und Brennen verbunden sein. Diese Begleiterscheinungen klingen normalerweise nach wenigen Tagen ab. Ein Schälen der Haut ist bei der Therapie mit Benzaknen® Wash erwünscht und fördert die Heilung. Bei länger andauernder Therapie kann es bei besonders veranlagten Patienten zu einer stärkeren Austrocknung der Haut kommen.

Sollten die Anbehandlungserscheinungen wie z.B. Spannen oder Austrocknen der Haut, Rötungen und Brennen zu stark werden, länger als eine Woche anhalten oder allergische Reaktionen auftreten, ist der Arzt aufzusuchen und das Präparat gegebenenfalls abzusetzen. Nach Abklingen der akuten Erscheinungen kann die Behandlung in den meisten Fällen mit weniger häufigem Auftragen fortgesetzt werden. In Zweifelsfällen suchen Sie bitte Ihren behandelnden Arzt auf.

#### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Website: <http://www.bfarm.de>

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. WIE IST BENZAKNEN® WASH AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen :**

Nicht über 25 °C lagern.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

Die Dauer der Haltbarkeit von Benzaknen® Wash nach Anbruch beträgt 6 Monate.

#### 6. WEITERE INFORMATIONEN

**Was Benzaknen® Wash enthält:**

Der Wirkstoff ist: Benzoylperoxid.

1g Suspension zur Anwendung auf der Haut enthält 50 mg Benzoylperoxid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Carbomer 940, alpha-Olefin (C<sub>14</sub> - C<sub>16</sub>) Sulfonsäuren-Natriumsalz, Glycerol, Acrylatcopolymer, Natriumhydroxid, Gereinigtes Wasser.

**Wie Benzaknen® Wash aussieht und Inhalt der Packung:**

Benzaknen® Wash ist eine weiße bis cremefarbene Suspension.

Benzaknen® Wash ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:

Tube mit 30 g,

Tube mit 50 g

Tube mit 100 g,

2 Tuben (Doppelpackung) mit je 100 g Suspension zur Anwendung auf der Haut

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

Galderma Laboratorium GmbH

Georg-Glock-Str. 8

D-40474 Düsseldorf

Telefon: (0800) 5888850

Telefax: (0211) 63558270

E-Mail: [patientenservice@galderma.com](mailto:patientenservice@galderma.com)

**Hersteller**

Laboratoires Galderma

Zone Industrielle – Montdésir

F-74540 Alby-sur-Chéran

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Juli 2013 überarbeitet.

**GALDERMA**

P210661-11

## **Gebrauchsinformation: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**

### **Benzaknen 5%-Gel**

Wirkstoff: Benzoylperoxid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage/Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

#### **Die Packungsbeilage beinhaltet**

1. Was ist Benzaknen 5%-Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Benzaknen 5%-Gel beachten?
3. Wie ist Benzaknen 5%-Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Benzaknen 5%-Gel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

#### **1. Was ist Benzaknen 5%-Gel und wofür wird es angewendet?**

Benzaknen 5% Gel ist ein Aknemittel. Der Wirkstoff, Benzoylperoxid, wirkt keimtötend, beeinflusst übermäßig auftretende Talgproduktion und besitzt einen Schälereffekt. Dadurch werden Pickel und Pusteln beseitigt und die Entzündung gehemmt.

Benzaknen 5%-Gel dient zur Behandlung von verschiedenen Formen der Akne vulgaris.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Benzaknen 5%-Gel**

**beachten? Benzaknen 5%-Gel darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie allergisch gegen Benzoylperoxid oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile des Präparates sind.

#### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Benzaknen 5% Gel anwenden.

Bitte melden Sie erste Anzeichen von Nebenwirkungen unverzüglich Ihrem

Arzt. Nur zum Auftragen auf die Haut.

Benzaknen 5%-Gel darf nicht auf die Schleimhäute oder in den Bereich der Mund-, Nasen- und Augenwinkel gebracht werden. Aufgrund der Bleichwirkung von Benzoylperoxid, die auch nach dem Auftragen auf die Haut anhält, soll das Präparat nicht mit Haaren oder farbigen Textilien in Berührung kommen.

Zu Beginn der Behandlung kann es zu einem leichten Brennen und Rötung sowie Abschälen der Haut kommen. Bei zu starker Schuppung, Hautausschlag oder Ödem (Flüssigkeitsansammlung) sollte die Therapie vorübergehend für 1-2 Tage bis zum Abklingen der Symptome unterbrochen werden.

Wenn Benzaknen 5%-Gel mit den Augen in Berührung kommt sollten diese sofort mit Wasser ausgewaschen werden.

Vorsicht ist geboten bei Anwendung von Benzaknen 5%-Gel im Nackenbereich oder anderen empfindlichen Hautregionen.

Einige Tage vor und während der Behandlung mit Benzoylperoxid ist eine intensive Sonnen- bzw. UV-Bestrahlung- soweit möglich- zu vermeiden.

Vom zusätzlichen Gebrauch hautreizender Mittel und von intensiver UV-Lichtbestrahlung (Sonne, Solarien) wird abgeraten, da es hierbei zu verstärkten Hautreizungen kommen kann.

Aufgrund der Bleichwirkung von Benzoylperoxid soll das Präparat nicht mit Haaren oder farbigen Textilien in Berührung kommen.

Um eine übermäßige Irritation der Haut zu vermeiden, soll Benzoylperoxid 5%-Gel nicht auf wunder, irritierter oder besonders empfindlicher Haut aufgebracht werden.

Vorsicht ist geboten bei wunder, irritierter oder besonders empfindlicher Haut.

#### **Anwendung von Benzaknen 5% Gel zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Präparate die einen abschälenden, irritierenden oder austrocknenden Effekt haben wie z. B: Salicylsäure, Schwefel oder Resorcin sollten nicht zusammen mit Benzaknen 5%-Gel angewendet werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Teilen Sie Ihrem Arzt mit, falls Sie schwanger sind, stillen oder eine Schwangerschaft planen. Über die Anwendung von Benzaknen 5%-Gel in der Schwangerschaft und Stillperiode entscheidet der behandelnde Arzt.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Benzaknen 5% - Gel hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Benzaknen 5% Gel** Enthält Propylenglycol. Dies kann Hautreizungen hervorrufen.

### **3. Wie ist Benzaknen 5%-Gel anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Anweisung des Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

#### Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Nach Reinigung der Haut das Gel dünn auf die getrocknete Haut auftragen, leicht einmassieren und trocknen lassen, um ein Ausbleichen der Wäsche zu verhindern. Üblicherweise wird zu Therapiebeginn Benzaknen 5%-Gel 1-2 mal täglich auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen. Bei Patienten mit empfindlicher Haut empfiehlt sich eine 1-mal tägliche Anwendung abends. Die Therapiedauer beträgt üblicherweise 4-6 Wochen. Je nach Art Ihrer Krankheit kann Ihr Arzt Benzaknen 5%-Gel eventuell auch für längere Zeit verschreiben.

#### Kinder unter 12 Jahren:

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Benzaknen 5%-Gel wurde bei Kindern vor der Pubertät (unter 12 Jahren) nicht untersucht, da in dieser Altersgruppe Akne vulgaris selten auftritt.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung und hören Sie nicht plötzlich mit der Anwendung des Medikamentes auf.

Wenn Sie glauben, das Medikament wirke zu stark oder zu schwach, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Benzaknen 5%-Gel angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie mehr Benzaknen 5%-Gel auf die Haut aufgetragen haben, als Sie sollten, wird dies nicht dazu führen, dass Ihre Akne schneller abklingt. Stattdessen kann Ihre Haut stark gereizt und gerötet werden.

Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Arzt oder einem Krankenhaus in Verbindung:

- Wenn Sie eine größere Menge Benzaknen 5%-Gel angewendet haben, als Sie sollten.
- Wenn ein Kind versehentlich das Arzneimittel eingenommen hat. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, was zu tun ist.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Benzaknen 5%-Gel vergessen haben**

Tragen Sie nicht die doppelte Menge auf, wenn Sie eine einzelne Anwendung vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Benzaknen 5% Gel abbrechen**

Wenn Sie die Anwendung von Benzaknen 5% Gel vorzeitig beenden, können die ursprünglichen Beschwerden Ihrer Hauterkrankung erneut auftreten. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Behandlung mit Benzaknen 5% Gel abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Benzaknen 5%-Gel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei empfindlichen Patienten kann der Therapiebeginn mit leichter Hautrötung, Brennen, Juckreiz und Spannungsgefühl der Haut verbunden sein. Außerdem kann es zu Austrocknung verbunden mit Abschuppung und möglichem Ödem (Flüssigkeitsansammlung)

kommen. Diese Begleiterscheinungen klingen normalerweise nach wenigen Tagen ab bzw. werden schwächer.

In seltenen Fällen kann es zum Auftreten einer Kontaktdermatitis (entzündliche Hautreaktion) kommen. In diesem Fall ist die Behandlung sofort abzubrechen.

Sollten die Anbehandlungserscheinungen zu stark werden oder länger als eine Woche anhalten bzw. allergische Reaktionen auftreten, ist das Präparat abzusetzen und der behandelnde Arzt aufzusuchen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **5. Wie ist Benzaknen 5%-Gel aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren

Nicht über 25° lagern. In der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nach Anbruch der Tube innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.

Das Gel darf nicht verwendet werden, wenn sichtbare Zeichen des Verderbes erkennbar sind (z.B. Nachdunkeln der Farbe).

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## **6. Weitere Informationen**

### **Was Benzaknen 5%-Gel enthält:**

-Der Wirkstoff ist: Benzoylperoxid. 1 g enthält 50 mg Benzoylperoxid

-Die sonstigen Bestandteile sind: Carbomer, Natriumedetat, Poloxamer 182, Docusat Natrium, Siliciumdioxid, Propylenglykol, Glycerolum, Methacrylat Copolymer, Natriumhydroxydlösung, gereinigtes Wasser.

### **Wie Benzaknen 5%-Gel aussieht und Inhalt der Packung:**

Benzaknen 5% - Gel ist ein weißes bis cremefarbenes Gel zum Auftragen auf die Haut und in Tuben zu 30 g erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

Galderma International  
92927 La Defense Cedex  
Frankreich

**Hersteller:**

Laboratoires Galderma  
Zone Industrielle Touvières  
74540 Alby sur Chéran  
Frankreich

Vertrieb in Österreich:

Galderma Austria GmbH  
Am Winterhafen 11  
A-4020 Linz  
Telefon: 0043 732 715 993

E-mail:

[austria@galderma.com](mailto:austria@galderma.com)

**Z.Nr.: 1-20509**

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im September  
2014.